




การใช้ยาในทางที่ผิด



การใช้ยาในทางที่ผิด

การใช้ยาในทางที่ผิด หมายถึง การนำยารักษาโรคมาใช้โดยไม่มีจุดมุ่งหมายทางการแพทย์ แต่มุ่งหวังเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่าง เช่น การกระตุ้นประสาทเพื่อให้ร่างกายมีการตื่นตัวอยู่เสมอ การใช้เพื่อความสนุกสนาน การทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม การหลบหนีจากความกดดันของสังคม เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และจิตใจของผู้ใช้ยา



ยาที่นำมาใช้ในทางที่ผิด เช่น



ยาแก้ไอผสมโคเดอีน
ชื่อเรียกอื่น : MB, ลีน, บาร์จ



ยาแก้ไอ เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
ชื่อเรียกอื่น : เรดเดวิล, เด็กซ์, DXM,
CCC, robo



ยาโรฮิบนอล
ชื่อเรียกอื่น : แมว ยาหลับ สีม่วง
ยาเมาโรเซ



ยาที่นำมาใช้ในทางที่ผิด

ลักษณะที่นำมาใช้ : ใช้ปริมาณมากเพื่อมุ่งหวังให้



เกิดอาการเคลื่นซุข โดย

- ดื่มโดยไม่ผสมกับอะไรเลย
- ผสมกับน้ำอัดลม และใส่น้ำแข็งดื่ม
- ผสมกับยาบางชนิด

ยาแก้ไอผสมโคเดอีน

ลักษณะ : โคเดอีนผลิตจากฝิ่น และถูกนำมาผลิตเป็นส่วนผสมของยาแก้ไอในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ยาแก้ไอชนิดเม็ด ยาแคปซูล และยาน้ำเชื่อมะ

การออกฤทธิ์ :

- ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง
- กดศูนย์ควบคุมการหายใจการหายใจ
- มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม ท้องผูก
ใจสั่นหัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น



ยาแก้ไอเดกซ์โทร เมทอร์แฟน

ลักษณะ : เป็นยาลดอาการไอแบบไม่มี
เซมพะมีลักษณะเป็นยาเม็ด และยา
น้ำเชื่อม

ลักษณะที่นำมาใช้ :

- ใช้ปริมาณมากทำให้เกิดอาการเมา เคลิบเคลิ้ม ลดความ
เจ็บปวด โดยการ
- ยาเม็ดย่นำไปบดเป็นผงเพื่อสูดเข้าทางจมูก หรือใส่แคปซูล
รับประทาน
- ยาน้ำนำไปผสมกับน้ำอัดลม

การออกฤทธิ์ :

- ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
- **การใช้ยาเกินขนาด**จะทำให้มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน
เวียนศีรษะ มึนงง ประสาทหลอน กระวนกระวายสั่น
ชัก เสียความทรงจำ หมดสติ กดการหายใจ และอาจถึง
แก่ชีวิตได้



ยาโรฮิบนอล

ลักษณะ : เป็นยานอนหลับ
มีลักษณะเป็นยาเม็ดรูปรีขนาดใหญ่
สีเขียวขี้ม้า

ลักษณะที่นำมาใช้ : นำไปผสมเครื่องดื่มโดยเฉพาะ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้ออกฤทธิ์แรงขึ้น โดยหวัง
ผลในการก่ออาชญากรรม เช่น การปลดทรัพย์ การ
ลวนลาม การข่มขืน เป็นต้น



การออกฤทธิ์ :

- ออกฤทธิ์กดระบบประสาท ทำให้ง่วงซึม มึนงง ปวดศีรษะ **ความ**
ทรงจำในระหว่างที่ได้รับยาลดลง **ประสาทหลอน** พฤติกรรมผิดปกติ
กรณีใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง
เพราะแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์ ทำให้กดประสาทมากขึ้น และอาจ
กดศูนย์ควบคุมการหายใจ



ยามิดาโซแลม หรือยาโดมิกุ่ม

ลักษณะ : เป็นยานอนหลับ มีทั้งยาเม็ด และ
ยาฉีด โดยยาเม็ดมีสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษร
ส่วนอีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งเม็ด

ลักษณะการนำไปใช้ : นำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมโดยการ
มอมเมาเหยื่อเป้าหมาย
ที่เป็นหญิงสาว

การออกฤทธิ์ : กดระบบประสาท ทำให้ง่วงซึม เดินเซ เพื่อ มึน
งง สับสน พูดไม่ชัด คลื่นไส้ อาเจียนหากได้รับยาติดต่อกันเป็น
เวลานานอาจทำให้เกิดภาวะพึงยาทั้งทางร่างกาย และจิตใจได้
เมื่อหยุดยากะทันหัน[★]อาจก่อเกิดอาการถอนยา คือ นอนไม่หลับ





ยาอัลปราโซแลม

ลักษณะ : เป็นยาเม็ด มีทั้งสีขาว สีชมพู และสีม่วง โดยสีม่วงจะมีความแรงมากที่สุด ซึ่งการใช้ยานี้ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

ลักษณะการนำไปใช้ : นำไปใช้เป็นยานอนหลับอย่างแรง หรือผสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อล่องละเมิดทางเพศ และใช้ผสมยาแก้ไอ หรือน้ำต้มใบกระท่อมแล้วดื่มเพื่อให้เกิดความมึนเมา

การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง

- ทำให้มีอาการง่วงซึม อ่อนแรง เดินเซ หลงลืม โดยจะจำเหตุการณ์ต่างๆ หลังรับประทานยาไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการนำยามาใช้ในทางที่ผิด กรณีใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง เพราะแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์ ทำให้กดประสาทมากขึ้น และอาจเกิดการหายใจจำทำให้เสียชีวิตได้



ยาไดอาซีแพม

ลักษณะ : เป็นยาเม็ด ยาแคปซูล และยาฉีด ซึ่งการใช้ยานี้ต้องมีใบสั่งจากแพทย์และอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ลักษณะการนำไปใช้ : ใช้ยาร่วมกับยาแก้ปวดที่สกัดจากฝิ่น และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมุ่งหวังให้เกิดความผ่อนคลาย และเคลิบเคลิ้ม

การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้ง่วงซึม อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการคล้ายอาการเมาค้าง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง หากใช้ปริมาณมากทำให้มีอาการง่วงนอนมาก สับสน หายใจลำบาก ไม่รู้สึกตัว นอกจากนี้การใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ติดยาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งหากหยุดใช้ทันทีอาจเกิดอาการขาดยาหรือถอนยา เช่น คลื่นไส้ นอนไม่หลับ มือสั่น หัวใจเต้นเร็ว ชัก ชีพจรเร็ว เป็นโรคจิตได้



ยาโนเมตาซีแพม

ลักษณะ : เป็นยาเม็ด เป็นยานอนหลับ และ
คลายเครียด ซึ่งใช้ภายใต้การควบคุมของ
แพทย์เท่านั้น

การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์กดประสาท มีอาการง่วงซึม มึนงง สับสน
สูญเสียการทรงตัว และสูญเสียความทรงจำ หากหยุดยาทันทีหลัง
ได้รับยาขนาดสูง หรือเป็นระยะเวลานานอาจเกิดอาการถอนยา อีก
ทั้งถ้าใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารที่มีฤทธิ์กดระบบ
ประสาทส่วนกลาง เช่น ยาแก้ปวดที่สกัดจากฝิ่น หรือยาแก้ปวดอื่น
ๆ อาจทำให้เสียชีวิตได้

ลักษณะการนำไปใช้ :

- ใช้ยาในปริมาณมาก
- ใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
- ใช้ยาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดอาการเคลิ้มฝัน
- ใช้เป็นยาที่ทำให้หลับหลังจากการใช้ยาอื่น และยาบ้า



ยา ترامาดอล

ลักษณะ : มีทั้งยาเม็ด ยาน้ำ ยาเหน็บทวาร ยาฉีด และยาแคปซูลสีเขียวเหลือง

ลักษณะการนำไปใช้ : นำไปใช้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกำลัง หรือน้ำอัดลม โดยหวังผลให้รู้สึกสบาย และเคลิ้มสุขได้แรงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ยาทุกวัน

การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์กดประสาทเช่นเดียวกับมอร์ฟิน ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม มึนงง ปวดศีรษะชัก การใช้ยาเกินขนาด ทำให้กดศูนย์ควบคุมการหายใจ การหายใจหายใจช้า ง่วงซึม หากรุนแรงจะหมดสติถึงขั้นโคม่ากล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจมีอาการชัก หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ และหัวใจอาจจะหยุดเต้น ทำให้เสียชีวิตได้



ยาโปรเมทราซีน

ลักษณะการนำไปใช้ : นำไปผสมกับเครื่องดื่มน้ำแข็ง หรือยาชนิดต่างๆ เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ยาแก้ปวด ยา ترامาดอล น้ำต้มใบกระท่อม โดยหวังผลให้เกิดอาการมึนเมาคล้ายดื่มเหล้า

การออกฤทธิ์ : ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางทำให้ง่วงซึม ปากแห้ง มองเห็นภาพไม่ชัด หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ ปัสสาวะขัด ท้องผูก หากใช้ยาในขนาดที่สูง ทำให้กระสับกระส่าย ชักเกร็ง หัวใจเต้นผิดปกติ ประสาทหลอน หวาดกลัวอย่างควบคุมไม่ได้ กดศูนย์ควบคุมการหายใจ หหมดสติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หยุดหายใจชั่วคราว และเสียชีวิตได้



ยาเบนซ์เฮกซอล

ลักษณะ : ลักษณะเป็นยาเม็ดกลมสีขาว

ลักษณะการนำไปใช้ : นำไปใช้ร่วมกับยาหลอนประสาทตัวอื่น ๆ โดยหวังผลให้เกิดความเคลิบเคลิ้มเป็นเวลานาน ๆ

การออกฤทธิ์ : ทำให้ง่วงซึม คลื่นไส้ อาเจียน บวมบริเวณหน้า ริมฝีปาก ลิ้น ประสาทหลอน ชิมเศร้า มีผื่นแดง คัน ผื่นลมพิษ มีอาการสับสน การใช้ปริมาณมาก และใช้ร่วมกับยาหลอนประสาทตัวอื่น ๆ จะทำให้หัวใจเต้นเร็ว ไม่เป็นจังหวะ หายใจลำบาก และชักได้



เคตามีน (Ketamine)

หรือ **ยาเค**

จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
เป็นกลุ่มยาเสพติด รักษาอาการปวดเรื้อรัง ระงับประสาทในผู้ป่วยหนัก หากใช้ในปริมาณมาก
จะหลอนประสาทอย่างรุนแรง หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้

ยาเสพติดในรูปแบบใหม่



ผลข้างเคียง

เกิดอาการประสาทหลอน ง่วงซึม
ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
หากใช้ในปริมาณมาก ทำให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ความผิดทางกฎหมาย

ผู้ขาย มีโทษ จำคุก 4 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 - 2,000,000 บาท

เคนมผง


“เคนมผง” มีส่วนผสมของ เฮโรอีน
โรเซ่ ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) และ
บางแหล่งข่าว ระบุว่า มี คีตาซีน



เคนมผง สารแต่ละตัว มีพิษต่อร่างกาย

พิษเฉียบพลัน

- มีความดันโลหิตสูง
- ชีพจรเต้นเร็ว
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- มีอุณหภูมิร่างกาย สูง เหงื่อแตก รูม่านตาขยาย การกระตุก ระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการกระวนกระวาย หวาดระแวง (paranoid psychosis) ประสาทหลอน ชัก และเสียชีวิต
- อวัยวะเป้าหมายหลัก คือ สมองและระบบหัวใจและหลอดเลือด



เมทแอมเฟตามีน
(Methamphetamine)

เคนแอมดวง สารแต่ละตัว มีพิษต่อร่างกาย



เคตามีน
(Ketamine)

พิษเฉียบพลัน

- มีอาการทางระบบประสาท โดยจะมีอาการสับสน ซึม หรือหมดสติชั่วคราว และยังสามารถพบอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงได้
- **อวัยวะเป้าหมายหลัก**ในการออกฤทธิ์ของสาร คือ ระบบประสาท โดยสามารถทำให้เกิดอาการประสาทหลอน อาการเคลิ้มสุขและง่วงซึมได้ และยังสามารถส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินปัสสาวะ

เคนมผง สารแต่ละตัว มีพิษต่อร่างกาย

เฮโรอีน
(Heroin)



พิษเฉียบพลัน

- **ระดับรุนแรง** กดการหายใจนำไปสู่การหยุดหายใจ ภาวะขาดออกซิเจน โคม่า หัวใจหยุดเต้น หรือการบาดเจ็บของปอดเฉียบพลัน (acute lung injury) ส่วนการชักซึ่งพบได้น้อย เกิดจากการขาดออกซิเจน การเสียชีวิตอาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อน การเสียชีวิต เป็นผลจากภาวะหายใจล้มเหลว

เคนมผง สารแต่ละตัว มีพิษต่อร่างกาย

ฟลูไนตราซีแพม (Flunitrazepam)
หรือ ยาโรเซ

พิษเฉียบพลัน

- **อาการเฉียบพลัน** ยามีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวง
ซึมเปนนหลัก ผู้เสพบางรายอาจมีอาการเดินเซ
พูดไม่ชัด สับสน การประสานงานของกล้ามเนื้อ
ผิดปกติ หากกินปริมาณมากหรือ ใชรวมกับ
ยากดประสาทชนิดอื่น อาจเกิดการหายใจได้



ไดอาซีแพม (Diazepam)

หรือยาที่รู้จักกันในการค้าว่า
แวลีียม (Valium)

ประเภทการออกฤทธิ์

จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4
ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
โดยออกฤทธิ์ที่สมองหรือระบบประสาทส่วนกลาง
ในทางการแพทย์ใช้เป็นยากล่อมประสาทหรือสงบประสาท
ทำให้จิตใจสงบ ใช้สำหรับรักษาอาการผิดปกติทางอารมณ์
เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล
ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว แก้อาการชัก เป็นต้น

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากการใช้ไดอาซีแพมนั้น
อาจทำให้มีอาการง่วงซึม เหนื่อยล้า
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่างกายสูญเสียความสมดุล
ลมหายใจอ่อนแรง มึนงง เห็นภาพหลอน ชีพเสรำ กล้ามเนื้อกระตุก
กลืนปัสสาวะไม่อยู่ รวมถึงเกิดอาการชักได้

ความผิดทางกฎหมาย

ผู้ขายมีโทษ จำคุก 2-10 ปี
และปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,000,000 บาท
มีไว้ในครอบครอง มีโทษ
จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ



สำนักงาน ป.ป.ส.
กระทรวงยุติธรรม

สายด่วน**แจ้งเบาะแส**ยาเสพติด 1386

สายด่วน**บำบัดรักษ**ยาเสพติด 1165



จบการนำเสนอ...

Image : <https://www.canva.com>

<https://www.freepik.com>



สำนักงาน ป.ป.ส
กระทรวงยุติธรรม

แจ้งเบาะแสยาเสพติด

โทร สายด่วน 1386